

شمارد این بروشور اطلاعاتی در مورد بیماری سپسیس دریافت میکنید و تاحدودی در مورد آنچه که در انتظار فرزند شماست آشنا میشوید ولی باید به یاد داشته باشید که همه این موارد مختص نوزاد شماست می بایست از ارانه این مطالب به دیگران خودداری نمایید.

عفونت خونی نوزادی (سپسیس) چیست؟

عفونت خونی یک حالت کاملاً جدی به حساب می آید حتی اگر خیلی سریع تشخیص داده شده و درمان شود می تواند منجر به بروز شوک و اختلال عملکرد اعضای بدن و همچنین ناتوانی دائمی و مرگ شود. نامهای دیگر این حالت مسمومیت خونی یا وجود باکتری در خون می باشد.

علل عفونت خونی چیست؟

در بسیاری از موارد عفونت خونی نوزادی باکتری ها در طی بارداری و یا در زمان زایمان از مادر به جنین یا نوزاد منتقل می شوند. بعضی از عوارض دوران بارداری که شانس بروز عفونت در نوزاد را افزایش می دهند شامل خونریزی - تب مادر - عفونت رحمی یا جفتی - پارگی زودرس کیسه آب در طی زایمان و زایمان طولانی و مشکل است. میکروبهایی که بصورت طبیعی بر روی پوست زندگی می کنند خیلی راحت از طریق راههایی که ذکر شد وارد جریان خون شده و منجر به بروز عفونت خون می شوند.

عفونت خونی نوزادی چه علایمی دارد؟

بعضی از شایعترین علائم عفونت در نوزادان کاهش میل به شیر خوردن - تب - ناآرامی و بد خلقی - ضعف و بی حالی - شلی - تغییر در ضربان قلب که یا بسیار تندتر از حد طبیعی و یا خیلی کندتر از آن می شود - تنفس سریع یا اشکال تنفسی - وجود دوره هایی که به نظر می رسد کودک نفس نمی کشد و وجود زردی است.

عفونت خونی نوزادی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود.



عفونت خونی نوزادی چگونه تشخیص داده شده و درمان می شود ؟

تستهای آزمایشگاهی شامل آزمایش خون و کشت خون و آزمایش ادرار است که باید حتماً به طریق صحیح و استریل نمونه گیری صورت گیرد. کشیدن مایع کمر (که این آزمایش باید بر اساس سن و وضعیت کلی و کودک صورت گیرد) و عکسبرداری بخصوص از قفسه سینه می باشد.

وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در

نوزادان و شیر خواران کوچک مستلزم مراقبتهای ویژه و انجام اقدامات درمانی بیمارستان می باشد تا در آنجا آنتی بیو تیکها از طریق رگ و به مدت حداقل ۴۸ ساعت تجویز شود. معمولاً قبل از آنکه تشخیص قطعی شود پزشکان تجویز آنتی بیوتیک را شروع می کنند زیرا تا انجام آزمایشات کامل و نتیجه آنها دو تا سه روز زمان لازم است. لذا عدم شروع درمان و منتظر ماندن برای جواب می تواند به عفونت اجازه دهد که به صورت کامل در بدن منتشر شده و منجر به بروز عواقب وخیمی شود.

عفونت خونی نوزاد چه عوارضی دارد؟

اگر عفونت درمان نشود گسترش می یابد و منجر به بروز عوارض بسیار شدیدی خواهد شد. عفونت می تواند بر عملکرد اعضای مختلف بدن تاثیر گذاشته و منجر به نارسایی کلیه - بیماری های ریه و صدمات مغزی میشود. معمولاً حس شنوایی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر عفونت به سرعت درمان نشود و یا اصلاً درمان نشود بخصوص در نوزادان میتواند منجر به مرگ شود.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان مکه و بوم
میدان امام سجاد (ع)

عفونت خونی نوزادی (سپسیس نوزادی)

(راهنمای والدین)



تهیه کنندگان:

سرپرستار

آسیه قلی زاده

پرستار

صدیقه سادات

بخش نوزادان

بهار ۹۸

چه وقت فرزندان را به دکتر ببرید؟

اگر یکی از علائم زیر مشاهده شود:

- کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- تب ۳۸ درجه سانتی گراد و بالاتر از آن از طریق مقعد در نوزادان تازه متولد شده و یا نوزادان تا یک ماه.
- زجر تنفسی (تلاش تنفسی) یا تنفس غیر عادی.
- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده ای یا کبود)
- خواب آلودگی و بی تفاوتی
- تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند و بیش از حد
- تغییر در تن عضلانی و سفتی یا شلی خاص
- تورم یا برجستگی ملاجها (فونتانلها)
- هرگونه تغییر رفتار یا حرکتی که شمارانگران کند.

همه علائم و نشانه ها به این معنی نیست که فرزندان مبتلا به سپسیس است اما در نوزادان زیر سه ماه باید نوزاد فوراً کنترل شده تا مطمئن شویم که اشتباه رخ نداده است.



آیا عفونت خونی قابل پیشگیری است؟

اگرچه تمامی انواع عفونتها قابل پیشگیری نیستند اما از بعضی از آنها میتوان اجتناب نمود. زنان حامله باید از نظر وجود هر گونه عفونت در کانال زایمانی مورد ارزیابی قرار گیرند. معمولاً این آزمایش در هفته ۳۵ تا ۳۷ دوران حاملگی انجام میشود و گاهی حتی می توان قبل از زایمان نیز این آزمایش را تکرار کرد. اگر وجود عفونت در کانال زایمان قطعی شد باید در حین زایمان از طریق رگ آنتی بیوتیک بگیرد. و حتی اگر خانم بارداری از نظر عفونت چک نشده باشد اما در گروه پر خطر باشد (مثلاً در حین زایمان تب داشته یا پارگی زودرس کیسه آب داشته یا زایمان طول کشیده بوده یا قبلاً سابقه زایمان نوزادی داشته باشد که مبتلا به عفونت شده است) نیز باید به منظور کاهش خطر انتقال عفونت در طی زایمان از طریق رگ آنتی بیوتیک بگیرد. امروزه با استفاده از واکسیناسیون علیه باکتری هایی خاص می توان شانس بروز عفونت به این باکتری ها را کاهش داد.

