

آیا خطری وجود دارد؟

چون عمل شکاف کام عمل طولانی و زیر بیهوشی عمومی می باشد کلیه عوارض مربوط به بیهوشی شامل خونریزی یا عفونت محتمل است . عفونت محل عمل خونریزی و تورم راه هوایی از عوارض عمده می باشد.

چه موقع می توانم تغذیه کودکم را شروع کنم؟

ما امیدواریم کودک شما بعد از بیدار شدن از بیهوشی بزودی تغذیه را شروع کند. بعد از آموزش پرستار مربوطه تغذیه را در حالت نیمه نشسته و کم کم شروع کنید.



شکاف کام قبل از جراحی اولیه

شکاف کام پس از جراحی

کودک من به چه مراقبتهایی بعد از عمل نیاز دارد؟

-کودک را در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار دهید .

-تا هوشیاری کامل چیزی از راه دهان داده نشود.

-مسکن ها طبق دستور پزشک جهت کاهش درد داده می شود.

زمان مناسب عمل برای این کودکان چه موقعی می باشد؟

زمان مناسب جراحی در شکاف کام قبل از شروع تکلم در فاصله ۹-۱۲ ماهگی و ترجیحا ۱۰ ماه می باشد (در صورت نداشتن مشکلات جسمی همراه)

چه کارهایی قبل از عمل باید انجام دهم؟

از حدود پنج ماهگی تغذیه کمکی به تدریج و با نظارت پزشک شروع شود و بعد از آموزش تغذیه با قاشق و لیوان به تدریج استفاده از سر شیشه قطع شود. با یادگیری نحوه مناسب تغذیه از عفونت ریه پیشگیری خواهد شد . در ضمن تغذیه مناسب جهت وزن گیری کافی کودک لازم است.



قبل از جراحی چه کارهایی انجام می شود؟ مشاورات پزشکی و آزمایشات و عکسبرداری جهت بررسی آنومالی های همراه و بررسی شنوایی و معاینات مکرر گوش صورت می گیرد و در صورت وجود عفونت درمان لازم صورت میگیرد.

پدر و مادر عزیز کودکان مبتلا به شکاف کام نیازمند مراقبت های شما در تمامی مراحل زندگی بویژه مواقع جراحی می باشند. لذا مطالعه دقیق و اجرای توصیه های ذیل جهت مراقبت بهتر و بهبود فرزندانمان موثر خواهد شد.

شکاف کام چیست؟

به باز شدن سقف دهان شکاف شکاف کام گفته می شود که در نتیجه رشد ناقص کام در زمان جنینی است که اکثرا توام با شکاف لب می باشد.

چرا رشد دهان کودک ما کامل نشده است؟

در اکثر موارد ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی موثر می باشد.

آیا کودک ما مشکلاتی در صحبت کردن خواهد داشت؟

کودکان مبتلا به شکاف کام بسته به سن و عمل جراحی و شرایط عمل و شدت شکاف کام حدود ۳۰ درصد اختلال تکلم خواهند داشت. کلیه کودکان مبتلا به شکاف کام نیاز به گفتار درمانی دارند و در صورت تکلم مختل ممکن است به عمل جراحی دیگری برای بهبود گفتار نیاز باشد.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان مازندران و بوشهر
بیمارستان امام سجاد (ع)

شکاف کام

(راهنمای والدین)



تهیه و تنظیم:

شهین غریبی
پرستار
صدیقه سادات
پرستار

بخش نوزادان

بهار ۹۸

این کودکان نیازمند پیگیری های مجدد از نظر دندانپزشکی گفتار درمانی - شنوایی - سنجی می باشند. لذا این مطالب در جهت بهبود هر چه بیشتر فرزندان و آموزش مراقبت های جراحی است و جایگزین توصیه پزشک مربوطه نمی شود.



با آرزوی بهبودی فرزندان شما

والدین عزیز اگر شما توصیه ها و اطلاعات بیشتری نیاز دارید لطفا با پرستار بخش نوزادان و با شماره تلفن ۰۱۶۴۳۳۳۲۲۰ الی ۷ داخلی ۶ تماس بگیرید.

- جهت جلوگیری از دستکاری زخم یا بردن دستها به دهان دستهای کودک با آتل محکم می شود تا ۴-۶ هفته ادامه خواهد یافت.

- شستشوی مرتب حفره دهان و دادن آب بعد از دادن غذا و دارو برای تمیز کردن خط بخیه ضروری است که به تمیز نگه داشتن کام جلوگیری از عفونت و ایجاد زخم کمک می کند.

- بی قراری کودک می تواند بابتل گرفتن وی از بین برود.

بعد از ترخیص از بیمارستان چه کارهایی باید کنیم؟

در صورت مشاهده علائم زیر به دکتر بیمارستان مراجعه کنید:

* بیقراری و تب بالای ۳۸ درجه

* نخوردن غذا و مایعات و کاهش اشتها

* وجود دردی که بامسکن از بین نمی رود

* داروهای آنتی بیوتیک تجویز یحتما به کودک داده شود تا محل عمل عفونت نکند.

* مراجعه بعدی طبق تجویز دکتر دکترا حتما انجام

